

هل تعلم خطورة الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي أ ؟

- يعد أكثر الأمراض الفيروسية شيوعاً حيث ينتقل في الأساس عن طريق الطعام والشراب الملوث بالفيروس.
- يعتبر فيروس التهاب الكبد -أ- أكثر أنواع الفيروسات مقاومة للعوامل البيئية من غليان وتجميد ومواد تنظيف.
- تشمل الأعراض العامة لهذا المرض ارتفاع في درجة الحرارة، الضعف العام، فقدان الشهية للطعام، اضطرابات بالمعدة، ویرقان (اصفرار بلون الجلد و العينين).
- يعانى الشخص المريض من هذه الأعراض لمدة تتراوح ما بين شهرين و ستة أشهر.
- يضطّر معظم المرضى إلى التغيب عن العمل أو الدراسة طوال فترة المرض تقريبا.
- غالبا ما تكون الإصابة في البالغين أشد خطورة مقارنة بالإصابة في السن الصغير









قد تستطيع أمتعتك حملُ عبء السفر.. **حصن نفسك ضد الإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي (أ) و (ب)** ولكن هل باستطاعتك ذلك؟

هل تعلم خطورة الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي ب ؟

- يعد احد اكثر الأمراض الفيروسية التي تصيب الكبد خطوره علي الإطلاق .
- قد يتسبب في الإصابة المزمنة للكبد طيلة الحياة.
- ينتقل الفيروس من شخص إلى آخر عن طريق نقل الدم، الوشم، الوخز بالإبر المستعملة، التعامل مع سوائل الجسم المختلفة الحاملة للفيروس والتي يمكن أن تنقل من شخص الى آخر عن طريق الاتصال الجنسي، عمليات نقل الأعضاء، أو الغسيل الكلوي، كما يمكن أن تنقله الأم لطفلها أثناء الولادة.
- يمكن أن تؤدي الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي ب الى الإصابة بتليف الكبد، الفشل الكبدى، سرطان الكبد كما يمكن أن تؤدي الى الوفاة لا قدر الله .

- * يتوفر تطعيم واحد (مدمج) للبالغين آمن وفعال يضمن تزويد الجسم بحماية مزدوجة ضد خطر الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي (أ) و (ب) في آن واحد.
- * يعتبر التطعيم المدمج مناسب وفعال في الوقاية من الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي (أ) و (ب) لكل شخص فوق عمر ١٩ سنة .
- * التطعيم المدمج ضد كل من التهاب الكبد الوبائي (أ) و (ب) يعطى على ٣ جرعات: جرعة أولية ثم جرعة ثانية بعد شهر و جرعة أخيرة بعد ٦ أشهر.

DO YOU KNOW THE DANGER OF HEPATITIS A?





-  Hepatitis A is one of the most common viral infections due to its spread through ingestion of contaminated food and drinks.
-  Hepatitis A virus is highly resistant to boiling, freezing and sterilization processes.
-  Symptoms of Hepatitis A include fever, weakness, loss of appetite, abdominal discomfort and jaundice (yellowing of skin and eyes).
-  Symptoms usually last for 2 – 6 months.
-  Infected people are often unable to work or attend school.
-  Symptoms of Hepatitis A infection are generally more serious in adults than in children.

YOUR LUGGAGE CAN HANDLE ALL THE TRAVELLING ABOUT.... CAN YOU?

Protect yourself against Hepatitis A & B



ARE YOU AWARE OF THE DANGER OF HEPATITIS B?

-  Hepatitis B is one of the most serious viral diseases that attack the liver.
-  It can cause lifelong liver infection.
-  A person can get infected in several ways including: blood transfusion, body piercing /tattooing, pricking with a used needle, infected body fluids that may be transmitted from one person to another as in sexual intercourse, organ transplant, haemodialysis and it can pass from an infected mother to baby during birth.
-  Hepatitis B can cause liver damage, failure, liver cancer and sometimes death.

- ★ There is ONE, combined vaccine for adults that can provide effective double protection against Hepatitis A and B at the same time.
- ★ The combined vaccine is a suitable and effective way for double protection against Hepatitis A and B for any person aged more than 19 years old.
- ★ The combined vaccine against Hepatitis A and B is given in 3 doses: An initial dose, then a second one after 1 month and the last dose after 6 months.